

## Mots clés

### Porifera

Phylogénie éponge  
Parazoa  
Multicellularité  
Hypothèse colonial  
Ancêtre radial  
Symétrie bilatérale secondaire  
Hypothèse syncytiale  
Coenocytial hypothesis  
Ancêtre bilateral  
Symétrie radiale secondaire  
Hypothèse polyphylétique sur l'origine des animaux  
Taxonome  
Classe Calcarea  
Classe Hexactinellida  
Classe Demospongiae  
Classe Homoscleromorpha  
Structure et composition des spicules  
Carbonate de calcium  
Silice  
Spongine  
Architecture Porifera  
Cellules spécialisés  
Choanocyte  
Flagelle  
Collerette  
Corps central de la cellule  
Cellule alimentaire  
Porocyte  
Spongocoele  
Ostium  
Pinacocyte  
Mesohyl  
Cellule amoéboïde  
Mésenchyme  
Osculum  
Ascon  
Forme corporelle asconoïde  
Sycon  
Forme corporelle syconoïde  
Pores dermiques  
Canal inhalant  
Canal radial  
Leucon  
Forme corporelle leuconoïde  
Canal exhalant  
Chambres des choanocytes  
Encroûtement  
Digestion  
Distribution des nutriments  
Phylogénie de l'évolution des formes corporelles  
Reproduction asexuée  
Bourgeonnement  
Méiose dans cellules des choanocytes/amoéboïde  
Hermaphrodite  
Monoïque  
Relâche des gamètes  
Protandrie  
Cycle vital  
Larve planktonique  
Larve parenchymula  
Larve amphiblastula  
Gemmules  
Micropyle  
Cellule amoéboïdes  
Archeocytes  
Totipotence  
Fragmentation  
Régénération  
Diffusion  
Ventilation par les flagelles  
Défenses physiques et chimiques  
Bords éguisés et dentelés  
Composés organiques  
Toxique  
Inhibition des coraux  
Ecologie  
Alimentation par filtration  
Cycle de calcium dans les océans  
Microhabitats

