

## Mots clés – Phylum Hemichordata et Chordata

Phylum Hemichordata  
Classe Enteropneusta  
Classe Pterobranchia  
Phylum Chordata  
Sous-phylum Urochordata  
Sous-phylum Cephalochordata  
Sous-phylum Craniata  
Ambulacraria  
Caractéristiques des Chordata  
Notocorde  
Cordon nerveuse tubulaire dorsale  
Fentes pharyngiennes  
Poches pharyngiennes  
Queue post-anale  
Endostyle  
Glande thyroïde  
Notocorde  
Axe squelettique  
Cellules turgescents  
Gaine élastique  
Gaine fibreuse  
Classe Enteropneusta  
Proboscis  
Collier  
Alimentation par triage sédimentaire  
Pores branchiaux  
Cordon nerveux dorsal  
Cordon nerveux ventral  
Diverticulum buccal  
Glomérule  
Coélome triparti  
Coélome du proboscis  
Coélome du collier  
Coélome du tronc  
Vers gland  
Classe Pterobranchia  
Alimentation par filtration  
Bras  
Tentacules  
Tube  
Tige  
Zooïde  
Colonies

Chordata  
Larve planktonique  
Anatomie Urochordata  
Tunique  
Parois corporelle  
Siphon oral  
Siphon de l'atrium  
Pharynx  
Endostyle  
Fentes pharyngiennes  
Atrium  
Cycle vital  
Métamorphose  
Larve avec notocorde  
Larve planktonique  
Paedomorphose  
Hypothèse de Garstang  
Cephalochorata  
Myomères métamériques  
Capuchon oral  
Cirres buccales  
Pharynx  
Fentes pharyngiennes  
Atrium  
Atriopore  
Caecum hépatique  
Nageoire dorsal  
Nageoire ventral  
Queue